

INFORMATIONS SUR LES MÉDICAMENTS DE DIABÈTE FAISANT URINER LE SUCRE (LES « ISGLT-2 »)

On retrouve trois différents médicaments dans la famille des inhibiteurs du SGLT-2.

*Il existe également des pilules combinant l'iSGLT-2 et la Metformine.

- Forxiga^{MD} (Dapagliflozine) ou *Xigduo^{MD}
- Invokana^{MD} (Canagliflozine) ou *Invokamet^{MD}
- Jardiance^{MD} (Empagliflozine) ou *Synjardy^{MD}

BÉNÉFICES



- ↓ sucre dans le sang par son élimination dans les urines
- Perte de poids
- ↓ pression artérielle
- Protection des reins
- Protection cardiaque



EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES



- Infections urinaires ou génitales
- ↑ soif et ↑ fréquence des urines
- Maux de cœur
- ↓ pression et **déshydratation**
- **Acidocétose diabétique**



ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUE



Rare, mais **URGENCE MÉDICALE**



SYMPTÔMES

- Maux de cœur et vomissements
- Douleur au ventre
- Respiration rapide
- Soif importante



Si vous présentez ces symptômes, **CONSULTEZ À L'URGENCE**

POUR DIMINUER LE RISQUE DE DÉSHYDRATATION OU D'ACIDOCÉTOSE, VOUS DEVEZ CESSER TEMPORAIREMENT VOTRE MÉDICAMENT QUI FAIT URINER LE SUCRE EN CAS DE :

1

Chirurgie ou colonoscopie



2

Diarrhées ou vomissements répétés (ex. : grippe, gastro, tourista, etc.)



3

Diète cétogène (Keto)



4

Alimentation très réduite



On recommande également de suspendre le médicament en cas de **plaies importantes**, afin d'éviter une mauvaise guérison pouvant se compliquer d'une infection de la plaie.

gmf.u
ROUYN-NORANDA

EN CAS DE DOUTE, N'HÉSITÉS PAS À CONTACTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ (INFIRMIER.E, PHARMACIEN.NE).

Mariane Boudreau, Radhia Lounis,
Hanane Meziani, Benka Sayo
Résidentes en médecine familiale